

## **Склад**

*Діючі речовини:* 1 капсула містить: Lactobacillus acidophilus - 9,0 мг; Lactobacillus rhamnosus - 5,0 мг; культура Йогурту (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) - 20,0 мг;

*допоміжні речовини:* лактоза, магнію стеарат, сироватка у порошку, кислота аскорбінова

## **Лікарська форма**

Капсули.

## **Фармакотерапевтична група.**

Антидіарейні мікробні препарати: комбінація лактобактерій.

## **Фармакологічні властивості.**

Імунологічні та біологічні властивості.

Молочнокислі бактерії препарату ГАСТРОЛАКТ входять до складу нормальної кишкової флори людини й відіграють важливу роль в імуностимулюючій, вітаміно-утворюючій, детоксикаційній й травній функціях організму.

Антимікробна активність молочнокислих бактерій проявляється щодо стафілококів, протею, ентеропатогенної кишкової палички та грибів роду Candida.

Молочнокислі бактерії знижують рН вмісту кишечника, запобігають росту і розмноженню патогенної і умовно патогенної мікрофлори. Лактобактерії є бар'єром для проникнення з кишечника у кров сенсibiliзуючих речовин (ендотоксинів, бактеріальних і харчових алергенів).

## **Показання для застосування.**

- Профілактика і лікування гострих та хронічних гастроентеритів у дітей та дорослих.

- Лікування стану дисбактеріозу, як місцевого, так і генералізованого.
- Профілактика дисбактеріозу під час і після прийому антибіотиків, хіміопрепаратів, променевої терапії тощо.
- У комплексній терапії алергічних захворювань (атонічних дерматитів, харчової алергії).
- Рекомендований пацієнтам, які не вживають кисломолочні продукти.

### **Спосіб застосування та дози.**

1. Для лікування препарат призначають:

- діти до 1 року: 1/2 - 1 капсула на день, під час їжі (відкрити капсулу й змішати її вміст із невеликою кількістю їжі або рідини);
- діти від 1-го до 3-х років: 1-2 капсули на день, під час їжі;
- діти від 3-х до 12-ти років: 1 капсула 3 рази на день, під час їжі;
- дорослі і підлітки старші 12-ти років: 1-2 капсули 3 рази на день, під час їжі.

Курс лікування - 25-30 днів.

При необхідності курс можна повторити.

2. Профілактично препарат призначається дорослим і підліткам старше 12-ти років по 1 капсулі на день, під час їжі. Дітям до 12-ти років - по 1/2 капсули на день.

Розкрийте капсулу та розділіть її вміст на дві половинки, необхідну для прийому кількість препарату змішайте з їжею або рідиною.

### **Побічні ефекти.**

Побічних ефектів не виявлено

### **Протипоказання.**

Протипоказань не виявлено

### **Взаємодія з лікарськими засобами.**

Препарат призначається у комплексній терапії разом із антибіотиками, сульфаніламидами, метронідазолом та іншими антибактеріальними препаратами.

### **Передозування.**

Не спостерігалось.

### **Застереження при застосуванні.**

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом та складною технікою.

Він цілком безпечний для немовлят, вагітних і жінок, які годують груддю.

### **Особливі вказівки.**

Препарат приймається під час їжі.

Дітям або дорослим, які не можуть проковтнути капсулу рекомендується відкрити капсулу та змішати її вміст із невеликою кількістю рідини або їжі.

### **Термін придатності.**

3 роки.

Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

### **Умови зберігання.**

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 4 до 8 °C.

### **Правила відпуску.**

Без рецепта.