

Склад

Діючі речовини: 1 капсула містить: Lactobacillus acidophilus - 9,0 мг; Lactobacillus rhamnosus - 5,0 мг; культура Йогурту (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) - 20,0 мг;

допоміжні речовини: лактоза, магнію стеарат, сироватка у порошку, кислота аскорбінова

Лікарська форма

Капсули.

Фармакотерапевтична група.

Антидіарейні мікробні препарати: комбінація лактобактерій.

Фармакологічні властивості.

Імунологічні та біологічні властивості.

Молочнокислі бактерії препарату ГАСТРОЛАКТ входять до складу нормальної кишкової флори людини й відіграють важливу роль в імуностимулюючій, вітаміно-утворюючій, детоксикаційній й травній функціях організму.

Антимікробна активність молочнокислих бактерій проявляється щодо стафілококів, протею, ентеропатогенної кишкової палички та грибів роду Candida.

Молочнокислі бактерії знижують рН вмісту кишечника, запобігають росту і розмноженню патогенної і умовно патогенної мікрофлори. Лактобактерії є бар'єром для проникнення з кишечника у кров сенсibilізуючих речовин (ендотоксинів, бактеріальних і харчових алергенів).

Показання для застосування.

- Профілактика і лікування гострих та хронічних гастроентеритів у дітей та дорослих.

- Лікування стану дисбактеріозу, як місцевого, так і генералізованого.
- Профілактика дисбактеріозу під час і після прийому антибіотиків, хіміопрепаратів, променевої терапії тощо.
- У комплексній терапії алергічних захворювань (атонічних дерматитів, харчової алергії).
- Рекомендований пацієнтам, які не вживають кисломолочні продукти.

Спосіб застосування та дози.

1. Для лікування препарат призначають:

- діти до 1 року: 1/2 - 1 капсула на день, під час їжі (відкрити капсулу й змішати її вміст із невеликою кількістю їжі або рідини);
- діти від 1-го до 3-х років: 1-2 капсули на день, під час їжі;
- діти від 3-х до 12-ти років: 1 капсула 3 рази на день, під час їжі;
- дорослі і підлітки старші 12-ти років: 1-2 капсули 3 рази на день, під час їжі.

Курс лікування - 25-30 днів.

При необхідності курс можна повторити.

2. Профілактично препарат призначається дорослим і підліткам старше 12-ти років по 1 капсулі на день, під час їжі. Дітям до 12-ти років - по 1/2 капсули на день.

Розкрийте капсулу та розділіть її вміст на дві половинки, необхідну для прийому кількість препарату змішайте з їжею або рідиною.

Побічні ефекти.

Побічних ефектів не виявлено

Протипоказання.

Протипоказань не виявлено

Взаємодія з лікарськими засобами.

Препарат призначається у комплексній терапії разом із антибіотиками, сульфаніламидами, метронідазолом та іншими антибактеріальними препаратами.

Передозування.

Не спостерігалось.

Застереження при застосуванні.

Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом та складною технікою.

Він цілком безпечний для немовлят, вагітних і жінок, які годують груддю.

Особливі вказівки.

Препарат приймається під час їжі.

Дітям або дорослим, які не можуть проковтнути капсулу рекомендується відкрити капсулу та змішати її вміст із невеликою кількістю рідини або їжі.

Термін придатності.

3 роки.

Не використовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 4 до 8 °C.

Правила відпуску.

Без рецепта.