

Склад: лігнін харчовий, харчові волокна фруктоолігосахариди, лактулоза кристалічна, загущувач крохмаль картопляний, розпушувач натрію кроскармелоза, ковзна речовина стеарат магнію.

Активні інгредієнти на 1 таблетку

Лігнін харчовий	342,11 mg (мг)
-----------------	----------------

Лактулоза кристалічна	101,01 mg (мг)
-----------------------	----------------

Без ГМО.

Властивості

Лактофільтрум - це добре збалансоване поєднання сорбента та пребіотика, що сприяє зниженню внутрішньої інтоксикації організму, різних її проявів (в т. ч. у вигляді алергічного, atopічного та себореїного дерматитів), а також нормалізації роботи кишечника шляхом відновлення балансу мікрофлори.

До складу Лактофільтрум входить:

- Лігнін - клітковина, ентеросорбент природного походження, який має високу сорбційну активність та детоксикаційну дію. Лігнін зв'язує в кишечнику і виводить з організму патогенні (шкідливі) бактерії, бактеріальні токсини та продукти їхньої життєдіяльності, інші алергени, алкоголь, аміак, солі важких металів, а також надлишок деяких продуктів обміну речовин, зокрема білірубін, холестерин, гістамін, серотонін, сечовину, інші метаболіти, що спричиняють розвиток внутрішньої інтоксикації організму та проявів у вигляді дерматозу.
- Лактулоза сприяє росту корисних бактерій та зменшує кількість шкідливих бактерій у кишечнику; лактулоза є пребіотиком, що нормалізує роботу кишечника завдяки підтримці здорового балансу кишкової мікрофлори; покращує засвоєння кальцію, який стимулює розвиток біфідо- та лактобактерій, сприяє нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів, правильному засвоєнню вітамінів, мікро- та макроелементів, а також активно стимулює неспецифічний імунітет.

Рекомендації щодо застосування: застосовувати як дієтичну добавку для дорослих та дітей віком від 3 років, як додаткове джерело нерозчинних харчових волокон (лігніну) та пребіотики (лактолози) з метою відновлення балансу мікрофлори кишечника. Лактофільтрум зменшує токсичне навантаження, завдяки чому сприяє оздоровленню шкіри та покращення стану при:

- алергічних захворюваннях та їх шкірних проявах (атопічний дерматит, кропив'янка, харчова алергія);
- акне та інших запальних захворюваннях шкіри;
- алкогольних інтоксикаціях;
- дисбіозі внаслідок антибіотикотерапії (дисбактеріозі кишечника та бактеріальному вагінозі);
- порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту (синдромі подразненого кишечника тощо);
- отруєннях різного походження.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: рекомендовано вживати *дітям віком від 3 років до 7 років* по 1 таблетці 3 рази на день, *дітям віком від 8 років до 12 років* по 1-2 таблетки 3 рази на день, *дітям віком від 12 років та дорослим* по 2-3 таблетки 3 рази на день.

Таблетку слід вживати, запиваючи питною водою, за 1-1,5 години до або після прийому їжі.

Для дітей молодшого віку рекомендовано таблетку попередньо подрібнити, змочити її питною водою кімнатної температури і вживати як пастоподібну суміш.