

Лорект являє собою ефективний антисептичний гігієнічно-профілактичний засіб природного походження, отриманий шляхом окислення риб'ячого жиру за допомогою ізотонічного розчину натрію хлориду.

Сировиною для отримання засобу являється риб'ячий жир виділений з органів і тканин морських тварин і містить в своєму складі велику кількість омега-3, омега-6, омега-9 ненасичених жирних кислот, а також вітаміни Д3, А, Е.

При взаємодії риб'ячого жиру з ізотонічним водним розчином натрію хлориду в присутності кисню повітря і при нагріванні відбувається процес окислення компонентів риб'ячого жиру. В ході процесу окислення жирних кислот риб'ячого жиру виникають карбонільні сполуки, що мають антимікробну активність відносно гноєрідної (піогенної) мікрофлори - синьогнійної палички, протeya, кишкової палички, стафілококів, а також щодо дріжджових грибів роду *Candida*. Така активність пов'язана з особливістю будови карбонільних сполук, що визначає їх здатність до інактивації багатьох ферментів мікробної клітини, що призводить до припинення життєво важливих метаболічних процесів в ній.

В результаті процесу окислення натурального риб'ячого жиру природним шляхом без додавання хімічних реагентів і оксидантів отримано засіб гігієнічно-профілактичний «ЛОРЕКТ», який є єдиним, що містить суму карбонільних сполук, достатню для прояву необхідної антимікробної та антисептичної активності.

Карбонільні сполуки у присутності ізотонічного розчину натрію хлориду знищують мікроби на слизовій оболонці носоглотки, не порушуючи її нормальну мікрофлору, видаляють віруси, бактерії і алергени, зволожують і очищають слизову носа, видаляючи надлишковий слиз, скоринки і найдрібніші частинки після операцій без ризику кровотечі.

В результаті покращується функція миготливого епітелію, підсилюється опірність слизової оболонки ротової порожнини, порожнини носа і придаткових пазух до впровадження хвороботворних бактерій і вірусів, нормалізуються реологічні властивості слизу.

Запропонований засіб допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання при захворюваннях носоглотки і придаткових пазух носа.

Склад:

Продукти окислення риб'ячого жиру Ектерицид

Фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтого кольору. В процесі зберігання допускається поява осаду світло-коричневого кольору, який легко розбивається при струшуванні.

Показання

Засіб гігієнічно-профілактичний «ЛОРЕКТ» рекомендовано до застосування:

- при інфекційних захворюваннях носоглотки та ротової порожнини;
- для полегшення стану при гострих і хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа, ротової порожнини різної етіології (риніти, синусити, тонзиліти (у тому числі ангіни), ларингіти, фарингіти, стоматити);
- у складі комплексного лікування і для профілактики гострих респіраторних та гострих респіраторних вірусних захворювань;
- для санації слизової оболонки носа;
- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій і ротовій порожнинах;
- для зволоження слизової оболонки носа та збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- у осіб, що страждають на часті риніти і синусити регулярне використання засобу дозволяє скоротити частоту та термін застосування лікарських препаратів;
- у складі комплексного лікування гіпертрофії аденоїдів, аденоїдиту.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів засобу.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Не застосовувати дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози

Перед початком застосування слід порадитися з лікарем.

Перед використанням струшувати.

ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ НОСОГЛОТКИ РИНІТИ, СИНУСИТИ, АДЕНОЇДИТИ

- у тому числі у складі комплексного лікування гострих респіраторних вірусних захворювань;
- для санації слизової оболонки носа;
- для полегшення стану при гострих і хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа, зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій порожнині;
- для зволоження слизової оболонки носа та збереження її захисних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- у складі комплексного лікування гіпертрофії аденоїдів
- для профілактики гострих респіраторних захворювань

Перед введенням засобу рекомендується звільнити носові ходи від слизу.

Надіти на флакон назальну насадку-розпилювач з захисним ковпачком.

Знята з насадки-розпилювача захисний ковпачок.

Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до препарату тримаючи флакон вертикально, ввести насадку в один з носових ходів та здійснити 1 натискання на клапан-насос.

У разі відсутності ознак гіперчутливості через 30 хвилин (набряк слизової оболонки носу, утруднення дихання, слюзотеча, чхання, свербіж) засіб можна застосовувати.

Дорослим проводити 3-4 натискання на клапан флакону у кожний носовий хід 3-4 рази на день.

Дітям: і натискання в кожний носовий хід 3-4 рази на день.

При інфекційних захворюваннях, а також для полегшення стану при гострих і хронічних запальних захворюваннях ротової порожнини (стоматити), ротоглотки (тонзиліти, ангіни), глотки (фарингіти), гортані (ларингіти), у тому числі у складі комплексного лікування гострих респіраторних вірусних захворювань; для зменшення проявів місцевого запального процесу в ротовій порожнині

Надіти на флакон оральний розпилювальний пристрій.

Зробити пробне зрошення з метою визначення чутливості до препарату тримаючи флакон вертикально, ввести насадку у ротову порожнину та здійснити 1 натискання на клапан-насос.

У разі відсутності ознак гіперчутливості через 30 хвилин (набряк слизової оболонки, свербіж, утруднення дихання, сльозотеча) засіб можна застосовувати.

Дорослим проводити 3-4 натискання на клапан флакону 3-4 рази на день.

Дітям: 1-2 натискання 3-4 рази на день.

Особливі вказівки

При зрошуванні носової порожнини не закидати голову.

З метою уникнення поширення інфекції не рекомендується користуватися однією і тією ж насадкою кільком особам, насадки щоденно обробляти ватними тампонами, змоченими у 70° розчині етилового спирту або іншого антисептику.

Під час розпилювання засобу слід уникати його потрапляння в очі.

Не є лікарським засобом

Побічні реакції

Алергічні реакції.

Умови зберігання

У захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску. Спрей.

Пакування

По 30 мл засобу у флакони зі скла з клапаном-насосом з насадкою-розпилювачем і захисним ковпачком (допускається додаткова комплектація оральним розпилювальним пристроєм), з інструкцією щодо застосування у пачці.

Термін придатності

24 місяці.