

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Метиленовий синій

Склад лікарського засобу

діюча речовина: метилтіонінію хлорид;

1 мл препарату містить метиленового синього 0,01 г (10 мг);

допоміжні речовини: етанол 60 %.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1%.

Темно-синя рідина з характерним спиртовим запахом.

Назва і місцезнаходження виробника

ВАТ "Монфарм".

Україна, 19100 Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X10.

Метиленовий синій належить до антисептичних засобів-барвників. В основі механізму антисептичної дії метиленового синього лежить його здатність реагувати з певними кислотами або

основними групами речовин грампозитивних бактеріальних клітин, із мукополісахаридами і білками з утворенням малорозчинних і повільно іонізуючих комплексів.

Опіки, піодермії, різні гнійно-запальні процеси шкіри.

Протипоказання

Підвищена чутливість до метилтіонінію хлориду. Дитячий вік до 1 року.

Належні заходи безпеки при застосуванні

Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Препарат можна застосовувати тільки у разі, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти

Застосовують дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози

Застосовують місцево. Дорослим та дітям від 1 року розчином змащують уражену ділянку шкіри, захоплюючи навколишні здорові тканини. Тривалість застосування визначається

індивідуально з урахуванням ефективності лікування.

Передозування

При передозуванні можливе підвищення ризику побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти

Алергічні реакції (подразнення шкіри, свербіж, кропив'янка).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не встановлена

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці, при температурі 15 - 25 оС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 мл або 20 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.