

Склад

1 капсула містить:

Активний інгредієнт: PYLOPASS (*Lactobacillus reuteri* DSM 17648) - 200 мг.

Властивості

Хелікотер - новий підхід в лікуванні пацієнтів з інфекцією *H. pylori*. Хелікотер містить сипучий порошок, отриманий шляхом ферментації і сушки з розпиленням *Lactobacillus reuteri* DSM 17648, який має специфічний анти-гелікобактерний ефект. Він специфічно зв'язує і агрегує шлункову бактерію *Helicobacter pylori*. Завдяки цьому унікальному способу дії Хелікотер допомагає знизити бактеріальне навантаження *H. pylori* в шлунку. В результаті відбувається необхідне зниження рівня *Helicobacter pylori*, що допомагає запобігти рецидив хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, а також запобігає появі захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки.

- Зменшує кількість *H. pylori* до безпечного рівня.
- Запобігає небажаним наслідкам ерадикації.
- Зберігає здоровий баланс мікрофлори в шлунку.

Pylopass допомагає знизити бактеріальне навантаження *H. pylori* в шлунку в цілеспрямованій формі. Він працює, утворюючи коагрегати з *H. pylori* через свою молекулярну форму, трохи схожу на липучку. Молекули на поверхні Pylopass, збігаються за розмірами зі структурами на поверхні *H. pylori*. Коагрегація залежить тільки від механічного скріплення цих структур. Після коагрегації він виводиться з організму через травний тракт, тим самим знижуючи рівень *H. pylori*. Pylopass може протистояти низькому рН шлунка, тому що він використовує механізм, який не залежить від виживання в шлунковому середовищі.

Рекомендації щодо застосування

Хелікотер рекомендується пацієнтам з хронічними шлунково-кишковими захворюваннями, фактором ризику яких є бактерія *Helicobacter pylori* - ерозивний гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Хелікотер також може бути рекомендований дорослим і дітям від 6 років для відновлення нормального травлення після діареї, викликаної інтоксикацією і сезонними гострими кишковими інфекціями.

Спосіб застосування

Хелікотер рекомендується дітям старше 6 років і дорослим - по 1 капсулі 1 раз на день під час їжі.

Доза може бути збільшена за рекомендацією лікаря.

Рекомендована тривалість лікування становить 4 тижні. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Побічні дії

Немає відомостей про побічні ефекти, пов'язані з використанням даного продукту.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів.

Застереження

Зберігати в недоступному місці для дітей молодше трьох років. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Харчові добавки не призначені для заміни різноманітного і збалансованого харчування і здорового способу життя.

Термін придатності дійсний, якщо продукт правильно зберігається при кімнатній температурі.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці!

Форма випуску

15 капсул в одному блістері в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.